


Biểu đồ theo dõi tình hình sốt xuất huyết tuần 28



Các hoạt động đáp ứng phòng chống dịch đã triển khai

Phun hóa chất diệt muỗi xử lý ca bệnh sốt xuất huyết tại xã Hương Bình. Số hộ được phun là 18 hộ, chỉ số bọ gậy trước phun xử lý BI=22; bọ gậy chủ yếu tập trung vào các vật dụng chứa nước như xô, chậu, vật phế thải. Tuyên truyền các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho người dân trong khu vực phun.

Tuyên truyền các biện pháp phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nổi bật như sốt xuất huyết, bạch hầu, ho gà... cho người dân trên địa bàn.

Các xã/phường duy trì hoạt động diệt lăng quăng bọ gậy, vệ sinh cảnh quang môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết lồng ghép vào ngày Chủ nhật xanh.



Hoạt động thu vét bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi, truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết

Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế tuyến thị xã và Trạm Y tế các xã/phường trên địa bàn thị xã.

Khuyến cáo cộng đồng

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo: Hiện nay, đã có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, do bệnh vẫn chưa được loại trừ ở Việt Nam, việc tiêm vắc xin phòng bệnh là biện pháp phòng ngừa quan trọng và hiệu quả nhất.

Không chủ quan với BỆNH BẠCH HẦU



Tác nhân gây bệnh
Vi khuẩn
Corynebacterium diphtheriae
thuộc họ *Corynebacteriaceae*



Cơ chế lây bệnh

Nhiễm
vi khuẩn



Lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp*
qua đường hô hấp



BIỂU HIỆN LÂM SÀNG



Viêm họng, mũi,
thanh quản
Họng đỏ, nuốt đau
Da xanh, mệt,
nổi hạch ở dưới hàm
làm sưng tấy vùng cổ

Có giả mạc màu trắng ngà
hoặc xám dính chặt vào
xung quanh tổ chức viêm,
bóc ra sẽ bị chảy máu



BIẾN CHỨNG NGUY HIỂM



Viêm cơ tim, tiên lượng
rất xấu, tỉ lệ tử vong rất cao



Viêm dây thần kinh dẫn đến
liệt các dây thần kinh
vận nhãn, cơ chi, cơ hoành



Viêm kết mạc mắt



Suy hô hấp do tắc nghẽn
đường hô hấp**

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA



Đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm
vắc xin đủ mũi tiêm và
đúng lịch***



Khi phát hiện sớm,
bệnh điều trị khỏi
bằng kháng sinh

*Khi tiếp xúc với đồ chơi, vật dụng có dính
chất bài tiết của người bị nhiễm vi khuẩn

**Có thể xảy ra ở trẻ em, đặc biệt là nữ nhi

*****Lịch tiêm chủng** vắc xin S11 hoặc ComBe Five
trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng:

- ✓ Mũi 1: Tiêm khi trẻ được 2 tháng tuổi
- ✓ Mũi 2: Sau mũi thứ nhất 1 tháng
- ✓ Mũi 3: Sau mũi thứ hai 1 tháng
- ✓ Mũi 4: Khi trẻ 18 tháng tuổi.



<https://infographics.vn>



Khoa Kiểm soát bệnh tật/YTCC&ATTP - TTYT thị xã Hương Trà
Email: kiemsoatbenhtathiv.huongtra@gmail.com